

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения и  
социального развития  
Республики Казахстан  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства  
АЛЕРГОЗОЛ-DF®**

**Торговое название**  
Алергозол-DF®

**Международное непатентованное название**  
Нет

**Лекарственная форма**  
Спрей назальный 0,03 % и 0,06 % 10 мл

**Состав**  
10,0 мл препарата содержат

	0,03 %	0,06 %
<i>активные вещества:</i>	нафазолина нитрат	3,0 мг 6,0 мг
	дифенгидрамина гидрохлорид	5,0 мг 10,0 мг

*вспомогательные вещества* - борная кислота, вода очищенная

**Описание**  
Прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа**  
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Назальные препараты. Антикongестанты и другие назальные препараты для местного применения. Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами.  
Нафазолин в комбинации с другими препаратами.  
Код АТХ R01AB02

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

Терапевтический эффект Алергозола-DF® развивается через 5-10 мин после применения препарата и продолжается до 5-6 ч, при частом

применении препарата продолжительность действия может сократиться до 4 ч. Активные вещества препарата Алергозол-DF<sup>®</sup> при местном применении могут всасываться в системный кровоток и оказывать резорбтивное действие.

### **Фармакодинамика**

Алергозол-DF<sup>®</sup> - комбинированный препарат для местного применения, содержащий нафазолин и дифенгидрамин. Оказывает противоаллергическое и сосудосуживающее действие.

Нафазолин при интраназальном применении способствует облегчению носового дыхания при ринитах. Способствует открытию и расширению выходных протоков придаточных пазух носа и освобождению Евстахиевых труб. Это способствует оттоку секрета и предотвращает осаждение бактерий на слизистой носа.

Дифенгидрамин - блокатор H<sub>1</sub>- гистаминовых рецепторов. Обладает выраженной противогистаминной активностью. Уменьшает или предупреждает вызываемое гистамином спазмы гладкой мускулатуры, повышение проницаемости капилляров, отек тканей, зуд и гиперемия. Так же оказывает местноанестезирующее действие, расслабляет гладкую мускулатуру в результате непосредственного спазмолитического влияния, блокирует в умеренной степени холинорецепторы вегетативных нервных узлов.

### **Показания к применению**

- острый ринит
- аллергический риносинусит
- аллергический вазомоторный ринит
- гиперемия и отечность слизистых оболочек верхних дыхательных путей после операций
- облегчение проведения риноскопии

### **Способ применения и дозы**

Интраназально.

*0,06 % спрей взрослым и подросткам старше 15 лет:* по 1-му впрыскиванию спрея в каждый носовой ход 3 раза в день.

*0,03 % спрей для детей:*

- от 2 до 6 лет – по 1-му впрыскиванию спрея в каждый носовой ход 1-2 раза в день;
- от 6 до 15 лет – по 1-му впрыскиванию спрея в каждый носовой ход 3 раза в день.

Курс лечения не более 1 недели.

### **Побочные действия**

- тошнота, головная боль

- повышение артериального давления, тахикардия
- раздражение слизистой оболочки носа
- реактивная гиперемия слизистой оболочки носа
- сухость во рту
- при применении более 1 недели – отек слизистой оболочки, атрофический ринит

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- закрытоугольная глаукома
- тяжелые заболевания глаз
- артериальная гипертония, тахикардия, выраженный атеросклероз
- гипертиреозидизм
- сахарный диабет
- хронический ринит
- гипертрофия предстательной железы
- одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14 дней после окончания их применения
- детский возраст до 2 лет (для Алергозол-DF 0,03 %)
- детский возраст до 15 лет (для Алергозол-DF 0,06 %)

### **Лекарственные взаимодействия**

При совместном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление сосудосуживающего действия нафазолина. Одновременное применение нафазолина с ингибиторами моноаминоксидазы и в течение 14 дней после его отмены может привести к гипертоническому кризу.

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

### **Особые указания**

Препарат оказывает резорбтивное действие, в связи, с чем применять его следует кратковременно – не более 1 недели, затем делать перерыв на несколько дней.

#### *Беременность и период лактации*

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно лишь в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка и плода.

#### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Учитывая побочные действия препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

### **Передозировка**

*Симптомы:* снижение температуры тела, брадикардия, артериальная гипертензия, сухость во рту, затруднение дыхания, возбуждение, спутанность сознания.

*Лечение:* отмена препарата, проведение симптоматического лечения.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 10 мл препарата в полипропиленовые флаконы с крышкой-распылителем и защитным колпачком. На каждый флакон наклеивают этикетку. По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель/Упаковщик**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.: (727) 253-03-88

### **Владелец регистрационного удостоверения**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

### ***Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции***

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел./факс: (727) 253-07-07, 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz