

УТВЕРЖДЕНА  
приказом председателя  
Комитета контроля медицинской  
и фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения и  
социального развития  
Республики Казахстан  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства  
НАФАЗОЛИН-DF**

**Торговое название**

Нафазолин-DF

**Международное непатентованное название**

Нафазолин

**Лекарственная форма**

Капли назальные 0,05 %, 0,1% по 10 мл

**Состав**

10 мл препарата содержат

*активное вещество* – нафазолина нитрат – 5 мг или 10 мг

*вспомогательные вещества* - борная кислота, вода очищенная

**Описание**

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антиконгестанты и другие назальные препараты для местного применения.

Симпатомиметики. Нафазолин.

КОД АТХ R01AA08

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

Терапевтический эффект нафазолина развивается через 5 минут после закапывания препарата и продолжается до 8 часов. При местном применении нафазолин может всасываться в системный кровоток и оказывать системное действие.

### **Фармакодинамика**

Альфа-адреномиметик. Нафазолин является симпатомиметиком с прямым стимулирующим действием на альфа<sub>2</sub>-адренорецепторы. Вследствие сосудосуживающего действия уменьшается отечность, гиперемия, экссудация. При интраназальном применении нафазолин способствует облегчению носового дыхания при ринитах. Способствует открытию и расширению входных протоков придаточных пазух носа и освобождению евстахиевых труб. Это способствует оттоку секрета и предотвращает осаждение бактерий на слизистой носа.

### **Показания к применению**

- острый ринит
- сенной насморк
- гиперемия и отечность слизистых оболочек верхних дыхательных путей после операций
- риноскопия

### **Способ применения и дозы**

Капли назальные 0,1% применяют взрослым и детям старше 15 лет по 1-3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день.

Как вспомогательное средство при поверхностной анестезии – по 2-4 капли на 1 мл местного анестетика. Курс лечения 5-7 дней. Повторный курс лечения назначает врач.

Капли назальные 0,05% применяют:

- детям от 2 до 6 лет - по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день
- детям от 6 до 15 лет - по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день.

Курс лечения 5-7 дней. Повторный курс лечения назначает врач.

### **Побочные действия**

- раздражение слизистой оболочки
- повышенное артериальное давление, тахикардия
- тошнота, головная боль
- реактивная гиперемия слизистой оболочки
- при применении более 1 недели - отек слизистой оболочки, атрофический ринит

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 2 лет
- артериальная гипертония, тахикардия, выраженный атеросклероз
- тяжелые заболевания глаз
- гипертиреозидизм
- сахарный диабет
- хронический ринит

- одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14 дней после окончания их применения

### **Лекарственные взаимодействия**

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

Несовместим с ингибиторами моноаминоксидазы.

### **Особые указания**

Нафазолин-DF с осторожностью применяется у лиц с лабильным артериальным давлением.

#### *Беременность и период лактации*

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только по строгим показаниям в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

#### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Учитывая побочные действия препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

### **Передозировка**

*Симптомы* - снижение температуры тела, брадикардия, артериальная гипертензия.

*Лечение* – симптоматическое.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 10 мл препарата в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками с контролем первого вскрытия или в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками. Флаконы вместе с инструкциями по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в групповую упаковку.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 18°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Без рецепта

**Производитель**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ТОО «DOSFARM», Казахстан

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства*

ТОО «DOSFARM», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3,  
тел./факс: (727) 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz