

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от « ____ » _____ 201__ г.
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

Спирт этиловый-DF

Торговое название

Спирт этиловый-DF

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения 70% и 90%

Состав

1,0 мл препарата содержит	70%	90%
<i>активное вещество:</i> этанол 96%	0,665 г	0,913 г
<i>вспомогательное вещество:</i> вода очищенная		

Описание

Бесцветная прозрачная, летучая, подвижная жидкость с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. Легко воспламеняется, горит синеватым слабо светящимся бездымным пламенем.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний кожи. Антисептики и дезинфицирующие препараты. Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие. Этанол.

Код АТХ D08AX08

Фармакологические свойства

Местное и рефлекторное действие этанола заключается в раздражающем, вяжущем и антисептическом эффектах. После воздействия на кожные покровы концентрированных растворов этилового спирта (70% и 90%) возникает вяжущий эффект, обусловленный денатурацией белковых тканей. Дубящее действие спирта на кожу снижает ее чувствительность и потоотделение, способствуя анальгезии и прекращению зуда.

Антисептический эффект связан с денатурацией цитоплазматических и мембранных белков микробных клеток. Наиболее чувствительной к этанолу является бактериальная флора. Наиболее оптимальной для бактерицидного действия препарата является 70% концентрация. При более высоких концентрациях дубящее (вяжущее) действие спирта на тканевые структуры затрудняет его диффузию, и глубина антисептического эффекта снижается.

Показание к применению

- в медицинской практике спирт этиловый применяют преимущественно как наружное антисептическое и раздражающее средство для обтираний, компрессов;
- обработка рук хирурга, операционного поля, медицинского инструментария.

Способы применения и дозы

Наружно – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток. Делают компрессы.

Побочные действия

- аллергические реакции;
- раздражение и ожоги кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей;
- может оказывать резорбтивное общетоксическое действие
- угнетение ЦНС.

Противопоказания

- гиперчувствительность к препарату.

Лекарственные взаимодействия

При приеме внутрь потенцирует эффект препаратов, угнетающих ЦНС.

Особые указания

Для компрессов (во избежание ожога) спирт этиловый следует разбавить водой в соотношении 1 : 1 (70%, 90%).

Беременность и период лактации

Применять с осторожностью

Детский возраст

Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении 1 : 4 (спирта и воды) – для 90% раствора, 1 : 3 (спирта и воды) – для 70% раствора.

Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

При управлении транспортным средством или потенциально опасными механизмами препарат применять с осторожностью, учитывая побочные действия.

Передозировка

При местном применении передозировка маловероятна.

Форма выпуска и упаковка

По 100 мл препарата в стеклянные флаконы, укупоренные пробками полиэтиленовыми с навинчиваемыми пластмассовыми крышками или крышками, унифицированными укупорочно-навинчиваемыми из полиэтилена или полимерных материалов. Флаконы вместе с инструкциями по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в групповую тару.

Условия хранения

Хранить в хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.: (727) 253-03-88

Владелец регистрационного удостоверения

ТОО «DOSFARM», Казахстан

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел./факс: (727) 253-07-07, 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz