

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета Фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства  
Таурин-DF**

**Торговое название**

Таурин– DF

**Международное непатентованное название**

Таурин

**Лекарственная форма**

Капли глазные 4 % 5 мл, 10 мл

**Состав**

1 мл препарата содержит

*активное вещество* – таурин 0,04 г,

*вспомогательные вещества*: метилпарагидроксибензоат, вода для инъекций.

**Описание**

Прозрачная бесцветная жидкость

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний глаз. Препараты для лечения заболеваний глаз прочие

Код АТХ S01XA

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

При местном применении таурин проникает в среды глаза, где и оказывает свое специфическое воздействие. При применении в терапевтических дозах препарат практически не всасывается в системный кровоток.

**Фармакодинамика**

Таурин-DF относится к аминокислотным препаратам, которые стимулируют репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях сетчатки глаза дистрофического характера, травматических

поражениях тканей глаза, патологических процессах, которые сопровождаются резким нарушением метаболизма этих тканей.

### **Показания к применению**

- травма и дистрофия роговицы
- катаракта (старческая, диабетическая, травматическая и лучевая)

### **Способ применения и дозы**

Препарат назначают взрослым.

Непосредственно перед применением желательно подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела.

При катаракте Таурин-DF назначают в виде инстилляций по 2-3 капли 2-4 раза в сутки в конъюнктивальный мешок пораженного глаза в течение 3 мес. Курсы повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 мес.

*Необходимо следить за тем, чтобы при закапывании кончик флакона-капельницы не контактировал с другими предметами или поверхностями. После закапывания флакон-капельницу плотно закрыть колпачком!*

### **Побочные действия**

*Редко:*

- При применении препарата могут возникнуть аллергические реакции в виде аллергического конъюнктивита, вызванные индивидуальной гиперчувствительностью к компонентам препарата.

Нарушения со стороны органов зрения:

- зуд глаз
- гиперемия конъюнктивы
- раздражение глаза (рези и жжение в глазах).

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский и подростковый возраст до 18 лет
- беременность и период лактации.

### **Лекарственные взаимодействия**

Не рекомендуется применять одновременно с другими глазными лекарственными препаратами. При необходимости одновременного применения с другими офтальмологическими препаратами интервал между их применением должен быть не менее 15 минут.

При одновременном применении с глазными каплями тимолола наблюдается потенцированное снижение внутриглазного давления, а также потенцированное снижение артериального давления.

### **Особые указания**

Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа, бронхоспазм).

#### *Беременность и период лактации*

Клинические исследования применения Таурина-DF у беременных и в период лактации не проводились, поэтому препарат не назначается беременным и кормящим матерям.

#### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

#### **Передозировка**

Данных о передозировке препаратом нет.

#### **Форма выпуска и упаковка**

По 5 мл или 10 мл препарата в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками с контролем первого вскрытия или в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками. Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку картонную.

#### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.  
Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Срок хранения**

3 года

После вскрытия флакона период применения - 28 сут.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

#### **Производитель**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.: (727) 253-03-88

#### **Держатель регистрационного удостоверения**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

**Наименование, адрес и контактные данные организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей**

**и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью  
лекарственного средства**

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3,  
тел./факс: (727) 253-07-07, 253-03-88, эл. адрес: [dosfarm@dosfarm.kz](mailto:dosfarm@dosfarm.kz)